

## Requisitos de terapia escalonada

Los medicamentos que requieren Terapia escalonada (ST, siglas en inglés) requieren prueba y error de agentes preferidos del formulario antes de su autorización. Si se han surtido los medicamentos con requisitos previos dentro del marco de tiempo especificado, la receta será procesada automáticamente en la farmacia. Se requerirá autorización previa para recetas que no se procesan automáticamente en la farmacia.

Nombre del medicamento o clase de fármaco	Requisito de terapia escalonada
Acyclovir en ungüento	Uso de acyclovir o Abreva oral
Azopt	Uso de dorzolamide o dorzolamide/timolol
Celecoxib	Uso de 3 de los agentes siguientes en los 180 días previos: Los NSAID del formulario o tramadol. Además, los pacientes con una reclamación para un PPI, H2 receptor antagonist, prednisone, warfarin, Xarelto, Pradaxa, Eliquis en los 90 días previos pueden recibir celecoxib sin los otros requisitos de terapia escalonada.
Inhibidores de DPP4: Tradjenta Jentaduetto	Uso de metformin en los 130 días previos
Foradil	Uso de AMBOS Arcapta Neohaler y Striverdi Respimat en los 130 días previos
Agonistas de GLP1: Trulicity Tanzeum	Uso de metformin en los 130 días previos
Esteroides nasales: Flunisolide Fluticasone (Rx genérica) Triamcinolone (Rx genérica)	Uso de 2 de cualquiera de los siguientes: Flonase OTC, Rhinocort OTC o Nasacort OTC dentro de los últimos 130 días
Antihistamínicos oftálmicos: Azelastine Epinastine	Uso de ketotifen ophthalmic en los 130 días previos
Oxymorphone ER	Uso de 2 de los agentes siguientes en los 180 días previos: fentanyl, methadone, morphine, oxycodone
Pantoprazole	Uso de 2 PPI distintos del formulario (omeprazole OTC, esomeprazole OTC o lansoprazole OTC) en los 130 días previos
Paricalcitol	Uso de calcitriol durante al menos 60 días
Ribavirin	Uso de Pegasys, Peg-Intron, Harvoni, Olysio o Sovaldi en los 30 días previos para asegurar que los pacientes estén tomando ribavirin con otros medicamentos apropiados para la hepatitis C y no como monoterapia
Spiriva	Uso de Incruse Ellipta O Tudorza Pressair en los 130 días previos
Inhibidores del Calcinurin tópico: Elidel	Uso de corticosteroides tópicos durante al menos 60 días en los 130 días previos

tacrolimus	
Tropium ER Tolterodine IR	Uso de oxybutynin durante al menos 60 días en los 130 días previos

Clase de medicamentos o fármacos Nombre	Requisito de terapia escalonada
Uloric	Uso de allopurinol durante al menos 60 días en los 90 días previos
Zafirlukast	Uso de un agonista beta inhalado, corticosteroide inhalado o theophylline en los 130 días previos
Zetia	Uso de 2 de las estatinas siguientes (atorvastatin, simvastatin o Crestor) en los 130 Días previos